B11-14

369
K
Y

LADO A

BASF
We create chemistry

Fertilizante biológico + Bioestimulante + Protector + Fungicida para semilla

Vault® HP + Acronis® Pack

Inoculante — Fungicida

Composición Vault® RZ, inoculante, líquido:

Bacterias fijadoras de nitrógeno *(Bradyrhizobium japonicum)* Cepa E 109. Este producto suministra 1 x 10^{10} bacterias viables a la elaboración y no menos de 1 x 10^{8} bacterias viables al vencimiento (equivalente a 80.000 bacterias viables por semilla de soja)

Composición Robust®, bioestimulante, líquido:

Bacillus subtilis, MBI 600 (*) 0,18%

Glicerina y agua c.s.p. 100%

(*) Contiene no menos de 2,2 x 10^{10} esporas viables por ml

Composición Extensión® GE, protector, líquido:

Sacarosa 30-60%

Agua y otros componentes c.s.p. 100%

Composición Acronis®, fungicida para semilla, suspensión concentrada:

pyraclostrobin: (metil-N-[[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oxi] -o-tolil]-N-metoxicarbamato ..... 5 g

metil tiofanato ..... 45 g

Ingredientes inertes c.s.p. ..... 100 cm^3

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
N° de registro en SENASA PACK N°: 135

LOTE

CONTENIDO NETO

Vault® RZ: fertilizante biológico, N° registro 21.043, 3 x 750 cc
Robust®: bioestimulante, N° registro 92.181, 3 x 90 cc
Extensión® GE: protector, N° registro 92.180, 3 x 580 cc
Acronis®: fungicida, curasemilla, N° registro 35.551, 3 x 1 lt

BASF Argentina S.A. Tucumán 1
Tel.: 4317-9600 (C1049AAA) Buenos Aires

Representante en la República Argentina de BASF SE,
67056 Ludwigshafen - Alemania

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

ATENCIÓN

® Marca registrada de BASF

www.divec.net
B11-14 - V2017
SAP:67644290

Para el tratamiento de 1.000 kg de semilla de soja con Vault® HP sugerimos el siguiente procedimiento: en un recipiente seco y limpio, realizar la mezcla bajo el siguiente orden: verter todo el contenido individual de una vejiga de 580 cc de Extensión® GE junto con el contenido de una botellita de 90 cc de Robust® y agitar suavemente para homogenizar la mezcla. Para finalizar, agregue el contenido de una vejiga de 750 cc de Vault® RZ al caldo, manteniendo la agitación continua para homogeneizar la mezcla. Cuando aplique solamente el pack de Vault® HP se recomienda agregar a la mezcla 2,2 lt de agua limpia libre de cloro para completar el volumen de caldo total a aplicar en la semilla. Se recomienda mantener la agitación durante el proceso de tratamiento de las semillas. Aplicar esta mezcla para tratar 1.000 kg de semillas mediante el uso de máquina tratadora de semilla o tambor rotativo, asegurando que se distribuya bien sobre la semilla de forma homogénea.

Tratamiento en aplicación secuencial: hacer la aplicación en las semillas, después de la aplicación de fungicidas y/o insecticidas, empleando el equipo adecuado (máquinas eléctricas, tambor rotativo, entre otros). Respetar siempre el orden de la aplicación de los productos: primero los fungicidas y/o insecticidas, luego el caldo que contiene Vault® HP.

Tratamiento de aplicación conjunta: desarrollar el caldo de Vault® HP según la indicación anterior, mezcla suavemente por 10 minutos hasta homogenizar la mezcla y por último realizar la aplicación de fungicida curasemillas Acronis®, según la dosis recomendada de 50 ml / 50 kg de semillas. Desarrollado el caldo de tratamiento se recomienda mantener agitación constante y consumir el caldo de tratamiento dentro de las 4 horas de elaborado. Respetar siempre el orden de la aplicación de los productos: primero el Extensión® GE, luego el Robust® y por último el Vault® RZ para desarrollar el caldo de aplicación a la semilla.

Cuidados a tener en cuenta durante el proceso: buscar el reparo de la sombra para no exponer el producto a la acción directa de los rayos del sol y en lugares ventilados. Siga el orden establecido respetando las relaciones de dosis entre productos según marbete. Prepare la mezcla según la cantidad de semillas a tratar, a fin de mantener los productos en óptimas condiciones al momento de su uso. Utilice la mezcla preparada dentro de las 4 horas. La ventana de utilización es de 15 días entre el momento de inoculado y siembra.

IMPORTANTE: en caso de preinocular, no exponer la semilla post tratada a la exposición solar y el viento, almacenar en lugar fresco y ventilado hasta el momento de la siembra.

Informaciones de Seguridad: Atención. H302: Nocivo en caso de ingestión.;H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.; H341: Se sospecha que provoca defectos genéticos.;H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.;H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P280: Llevar guantes de protección.;P261: Evitar respirar la niebla.;P264: Lavar cuidadosamente las partes contaminadas del cuerpo tras la manipulación.;P270: No comer, beber o fumar durante su utilización.;P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.;P333 + P313: En caso de irritación cutánea o erupción cutánea: Consultar a un médico.;P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.;P391: Recoger el vertido.;P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / si la persona se encuentra mal.;P330: Enjuagarse la boca.P501: Eliminar el contenido / el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales.

ATENCIÓN